



Viventem

CUAJA-ELONGACIÓN DE INFLORESCENCIAS-
FRUTA-SISTEMA VASCULAR-LLENADO AZÚCARES-
MADURACIÓN-COLOR VERDE DEL PEDÚNCULO DE
LA FRUTA

Es una formulación líquida (SL) que contiene una base de Carbono Orgánico, a la cual se le adicionan nutrientes optimizantes de la fisiología de la planta y respuesta en su fruta. De no existir factores de manejo general o enfermedad que limite la expresión de la plantación, este producto tiene una rápida acción de Activación y Respuesta en el proceso de producción fruta.

Beneficios de las aplicaciones

- Muy temprana: aplicaciones en botón y en floración inhiben la acción o contenido de etileno que afecta la cuaja y retención de cuaja.
- Temprana: mayor crecimiento vegetativo, de la inflorescencia-fruta
- Post cuaja: mejor sistema vascular y color verde del pedúnculo, pedicelo, raquis. Contrarresta la caída de frutitos o fruta (June Drop). Puede ser mezclado con Crisanto (se complementan), de la línea InnoAgro.

Aplicación foliar

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos y hortalizas. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. En horas frescas se optimiza su absorción. En aplicación de alto volumen vía terrestre se consigue el mejor efecto. Puede ser aplicado con máquina electrostática o avión.



Composición

Caracterización nutricional aprox.	Porcentaje (%), p/p
Carbono orgánico total	5,0
pH (dilución al 10% v/v)	6,0-6,5
Solubilidad (a 20 °C)	100 %
Densidad	1,15 a 20 ° C

Recomendaciones generales : uso foliar, fraccionar en dos a cuatro aplicaciones, según objetivos.

Frutales	Dosis anual Lt/Ha	Épocas de aplicación, dividir la dosis total indicada
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno, Nectarino	2-3	Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Avellano Europeo y Nogal	2	Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Vid de Mesa, Vid Vino y Pisquera	2-3	Con inflorescencias a la vista y 45 días post cuaja
Kiwi	1,5-2,0	En botón y 30 días post cuaja
Arándano, frutilla y frambueso	1,5-2,0	En floración, repetir a los 15 días post cuaja.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	1,5-2,0	Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Palto	2-3	Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Manzano y Peral	2-3	Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.
Olivo	1,5	Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.

