



FERTIGEN

5X

Activador de la funcionalidad y crecimiento anual de la Raíz. Acondicionador del suelo.

Fertilizante Uso a la raíz

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, adicionalmente acondicionador de la física del suelo. Este producto tiene una rápida acción de Activación de la raíz anual. Suelos salinos.

Beneficios relevantes de las aplicaciones

En primavera:

Una vez brotada la planta y temperatura de suelo $> 12^{\circ}\text{C}$, activa la funcionalidad de la raíz, mejor absorción y asimilación.

Para una mejor respuesta puede ser mezclado con Raigen.

Una mejor raíz funcional, mejora la absorción de agua, síntesis hormonal endógena, absorción y translocación de agua y nutrientes hacia la copa y su fruta. .

Al mezclar con Raigen complementa su acción benéfica en la fruta.

Aplicación a la Raíz

Aplicar a través del fertirriego

Aplicar en un tiempo de fertirriego, en a lo menos 60 minutos o más, para una adecuada distribución en los diferentes emisores.

Aplicar en el tercio medio del riego para dejar el producto localizado en plena zona de raíces activas.

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, hortalizas.

Composición

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos:+562 23679773 +56982495278, +56982495276

Caracterización nutricional	% peso/peso	% peso/volumen
Carbono orgánico total	3,0	3,4
Silicio (SiO ₂)	4,5	5,8
pH (dilución al 10%)	5,5	5,5
Densidad (a 20 °C)	1,15	1,15
Solubilidad (a 20° C)	100,0	100,0

Recomendaciones generales

Frutales	Dosis anual Lt/Ha	Epoocas de aplicación
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno y Nectarino	6-8	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.
Avellano Europeo y Nogal	6-8	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	6-8	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.
Kiwi	6-8	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.
Arándano, frutilla y frambueso	4-6	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	6-8	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.
Palto	6-8	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.
Manzano y Peral	6-8	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.
Olivo	6-8	A partir de brotación primaveral, cada 15 días.

Cultivo y Hortalizas	Dosis anual Lt/Ha	Epoocas de aplicación
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	4	Desde plantación, cada 7 días.
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	4	Desde plantación, cada 7 días.
Cereales, Papa y otros Cultivos	4	desde emergencia, cada 7 días

InnoAgrok S.A.

Napoleón 3565, oficina 1103, Las Condes, Santiago de Chile

Ex-Hacienda Maule, Las Hortensias s/n, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos:+562 23679773 +56982495278, +56982495276